

1931
Lane Medical Library

Ueber die Blutzuckerkurve nach
Lävulosebelastung bei verschiedenen
Krankheitszuständen

Dissertation

zur Erlangung der Doktorwürde
der medizinischen Fakultät
der Hessischen Ludwigs-Universität zu Gießen

vorgelegt von
Robert Neuhaus
Hagen i. Westf.

Westdeutsche Volkszeitung, Hagen i. Westf.

1931



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Ueber die Blutzuckerkurve nach
Lävulosebelastung bei verschiedenen
Krankheitszuständen

Dissertation

zur Erlangung der Doktorwürde
der medizinischen Fakultät
der Hessischen Ludwigs-Universität zu Gießen

vorgelegt von
Robert Neuhaus
Hagen i. Westf.

Über die Bildung der
Lauten aus den
Vocalen

Dissertation

von
Herrn Dr. phil. phil.

Dr. phil. phil.

Dr. phil. phil.

Herrn Dr. phil. phil.

Herrn Dr. phil. phil.

Herrn Dr. phil. phil.

Herrn Dr. phil. phil.

Herrn Dr. phil. phil.

Ueber die Blutzuckerkurve nach Lävulosebelastung bei verschiedenen Krankheitszuständen

von Robert Neuhaus

Der klinische Befund bei Lebererkrankungen, der mittels der Palpation, der Untersuchung des Harns, des Stuhls und der Röntgentechnik erhoben wird, klärt in vielen Fällen die Aetiologie und Prognose der Erkrankung nicht auf. Daher sucht man schon seit Jahren nach einer geeigneten funktionellen Leberprüfung. Alle Leberfunktionsprüfungen haben das eine gemeinsam, daß ein Stoff gegeben wird, der durch die Leber verarbeitet und ausgeschieden werden muß. Dieses sind körperfremde Stoffe, etwa Farbstoffe oder solche Substanzen, die normalerweise im Haushalt des Körpers der Leber angeboten werden. Vor allem sind die K. H. Galaktose, Lävulose, Dextrose und Milchsäure die beliebtesten. Man hat beim Gesunden festgestellt, daß eine gewisse Menge dieser Substanzen von der Leber verarbeitet werden, daß aber bei Leberkranken eine Verschiebung der Toleranzgrenze nach unten stattfindet. Ueber die von der Leber verarbeiteten Stoffe hinaus werden die unverarbeiteten wieder ausgeschieden und erscheinen zum Teil wieder im Harn.

Strauß¹ glaubte gerade in der alimentären Lävulosurie nach Lävulosedarreichung ein Symptom der Leberschädigung zu erkennen; doch hängt die Lävuloseausscheidung im Harn nicht allein von der Leberschädigung ab, sondern, wie van Crefeld und Laudénus² u. a. zeigten, in hohem Maße von der verschiedenen Durchlässigkeit der Niere für Lävulose. Isaac³ bestimmte deshalb den Zuckergehalt des Blutes in gewissen Zeitabständen. Ueber solche Versuche berichten auch van Crefeld und Laudénus², Hetényi⁴ und in letzter Zeit Heinicke und Peters⁵, die früh

nüchtern bei den Patienten den Blutzucker bestimmten, darauf 100 gr Lävulose in 100—200 gr Tee per os gaben und in Intervallen von $\frac{1}{2}$, 1, 2, 3 Stunden nach Lävulosegabe den Blutzucker nach Hagedorn-Jensen bestimmten.

Sie erhielten mit dieser Methode bei Gesunden Kurven, die in der ersten halben Stunde durchschnittlich um 20 mgr Prozent anstiegen. Der höchste Anstieg betrug 28 mgr Prozent; nach 3 Stunden war immer der Nüchternwert erreicht, meist sogar früher, zuweilen sank er sogar etwas unter den Anfangswert. Als Grenzwertkurve zum pathologischen bezeichnen sie die bei den Normalkurven zu den einzelnen Zeiten ermittelten Höchstwerten: 0, 28, 22, 11, 5, wobei 0 den Anfangswert darstellt.

Bei Leberschädigungen vermißten sie nie abweichende Kurven, ebenso bei Vasoneurotikern, wie schon Scharpf⁶ vorher zeigte.

Um den Wert dieser Leberfunktionsprüfung zu erkennen, wurde sie bei Gesunden und bei den verschiedensten Krankheiten mit und ohne Leberschädigung nachgeprüft.

Gruppe I. Normal-Fälle.

Gruppe II. Krankheiten ohne klinisch nachweisbare Leberschädigung.

Gruppe III. Krankheiten nervöser und innersekretorischer Störungen.

Gruppe IV. Leberkranke.

Gruppe I.

Normalfälle

Von den Kurven der Gesunden (Tab. I.) zeigte nur Fall 2 Tab. I. und die Wiederholungskurve von F 5 den Höchstwert schon nach 30 Minuten; die anderen Fälle hatten ihren Gipfelwert erst nach einer Stunde erreicht. Abgesehen von F 5 zeigte F 4 den Höchstanstieg von 33 mgr Prozent und einen Gipfelwert von 121 mgr Prozent. Alle Kurven fielen nach 3 Stunden bis fast zum Nüchternwert oder darunter ab. Dabei verlaufen die Kurven an verschiedenen Tagen nicht immer gleich, wie F Ia und b zeigt.

Kugelmann⁷, der sich ebenfalls mit der Lävulosebelastung beschäftigte, fand bei 6 Gesunden entsprechend den Ver-

suchen von Jsaac und Grafe⁸ nie einen Blutzuckerwert über 120 mgr Prozent nach Lävulosegabe. Nach spätestens 2 Stunden kehrte die Kurve zum Anfangswert zurück. Jedoch stieg eine Kurve auf 120 mgr Prozent an, und eine andere zeigte einen Anstieg von 30 mgr Prozent.

Uebereinstimmend geben die Autoren an, daß der Nüchternwert bei Gesunden nie 100 mgr Prozent übersteigt.

Nach den Angaben der Literatur und nach den Ergebnissen dieser Arbeit möchten wir weder das Uebersteigen des Nüchternwertes über 120 mgr Prozent um einige mgr Prozent noch einen Anstieg von über 28 mgr Prozent vom Nüchternwert aus gerechnet als pathologisch ansehen, sondern als Grenze zwischen Normalem und Pathologischem die Kurve stellen, deren Gipfelwert spätestens nach einer Stunde erreicht ist und nur um ein Geringes über 120 mgr Prozent hinaussteigt, die aber nach 3 Stunden zum Nüchternwert zurückgekehrt ist.

Eine Besonderheit stellt F 5 dar, dessen erste Kurve nach unserer Ansicht ausgesprochen pathologisch ist. Klinisch ließ sich in diesem Falle nichts Krankhaftes finden. Jedenfalls mahnt der Kurvenverlauf zur Vorsicht bei der Beurteilung krankhafter Kurven.

Gruppe II.

Krankheiten ohne klinisch nachweisbare Leberschädigung

Von den verschiedenen Fällen ohne klinisch ins Auge fallende Leberschädigung (Tab. II.) erreichten nur die Gipfelwerte bei Lues cerebri, Arteriosklerose, Postencephalitis, perniziöser Anämie, Arthritis deformans, ein Fall von Ischias, Ascites auf Tbc-Basis, Ostitis fibrosa, eine pathologische Höhe. Während bei Arteriosklerose mit Herzschädigung und perniziöser Anämie eine Leberschädigung leicht zu erklären ist, ist die erhöhte Kurve bei Lues cerebri wahrscheinlich durch die Salvarsankur bedingt oder wie auch bei Postencephalitis vielleicht im Sinne einer Schädigung des vegetativen Nervensystems aufzufassen. Bei dem Ascites auf Tbc-Basis ist vielleicht ähnlich wie bei F 17 Tab. IV. doch eine Leberschädigung vorhanden, die klinisch nicht nachweisbar war.

Bei Patienten mit perniziöser Anämie fanden Meulengradht und Paul Iversen⁸ in den schlechten Perioden Steigerungen des Nüchternwertes des Blutzuckers sowie bisweilen einen pathologischen Kurvenverlauf. In unserem Fall (Tab. 2. Nr. 28) verliefen beide Kurven gleich, obwohl der Färbeindex am Beginn der Behandlung 1,5 und 1,1 beim zweiten Versuch (Ende der Behandlung) war. Bei F 12 (Ischias) und F 15 (Arthritis deformans) bestand der dringende Verdacht auf einen Diabetes latens. Diese Kurven geben wir deshalb nur mit Vorbehalt wieder. Eine Besonderheit zeigt F 27 Ostitis fibrosa, der nach 2 Stunden zum Nüchternwert zurückgekehrt, nach der dritten Stunde den Höchstwert erreicht; manchmal stieg allerdings auch bei anderen Kurven der Drei-Stundenwert, obwohl die Kurve vorher zum Nüchternwert abgesunken war, wieder an, jedoch nicht in diesem Maße. Bei der unklaren Aetiologie dieser Krankheit möchten wir auf eine Erklärung verzichten.

Fall 5 und 6 (Pylorostenose und Ulcus duodeni) liegen an der Grenze zwischen normalen und pathologischen Kurven. Bei letzterem Fall bestand allerdings auch ein Verdacht auf Cholelithiasis.

Die Kurven bei Magenleiden zeigen keine erhöhten Werte, wohl aber einen atypischen Verlauf im Sinne eines verlangsamten Abfallens, der durch Resorptionsstörungen bedingt sein könnte.

Der Fall 22 von Herzfehler, der kurze Zeit vorher eine Stauungsleber gehabt hatte, zeigt keine pathologische Kurve. Hetényi⁴ fand dagegen einmal bei Stauungsleber 50 Minuten nach Lävulosegabe einen erhöhten Wert von 143 mgr Prozent. Nach Heinicke und Peters (s. o.) erreichte ein untersuchter Fall von Stauungsleber nach 2 Stunden erst den Höchstwert. Nach Beseitigung der Dekompensation verlief die Kurve normal; nur bei Stauungsindurationen der Leber kehrten die Kurven auch nach drei Stunden noch nicht zur Norm zurück.

Gruppe III.

Nervöse und innersekretorische Störungen

Von den vier Fällen mit nervösen Störungen (Tab. III.) zeigen drei Kurven einen Dreistundenwert, der um 13—15 mgr Prozent unter den Nüchternwert gesunken ist. Ein ungefähr ebenso tiefes Sinken des Kurvenschlußwertes unter

den Anfangswert zeigen von allen untersuchten Fällen nur noch drei, nämlich (s. Tab. II. F 5) Pylorusstenose mit 12 mgr Prozent, Arthritis deformans (Tab. II. F 15 a u. b) mit 9 resp. 14 mgr Prozent. Jedoch fiel auch bei einem Normalfall (Tab. I. F. 1.) die erste Kurve um 11, die zweite Kurve aber nur um 7 mgr Prozent unter den Anfangswert.

Fall 4 mit allgemeiner Nervosität hat als Nüchternwert nur 64 mgr Prozent. Ein so niedriger Anfangswert wurde nur noch einmal bei einer Pankreatitis (s. Tab. III. F. 14) erreicht. F. 4 blieb entgegengesetzt den anderen Fällen von nervösen Störungen nach drei Stunden noch hoch über dem Anfangswert stehen. Die Wiederholungskurve am Entlassungstag gab, abgesehen von dem leicht erhöhten Nüchtern-Zuckerspiegel (104 mgr Prozent) eine normale Kurve mit einem Anstieg von nur 10 mgr Prozent.

Bei den sieben Fällen von Hyperthyreoidismus (s. Tab. III.) steht die Kurve von Fall 11 an der Grenze des Normalen. Klinisch fanden sich bei diesem Patienten alle Zeichen einer Thyreotoxikose: leicht vergrößerte Thyreoidea, leichter Exophthalmus, feinschlägiger Tremor der Finger, Dermographismus, wechselnde Herzfrequenz (68—110 Pulsschläge pro Minute), Grundumsatzsteigerung um 25 Prozent. Jedoch sprach die Gewichtszunahme von 1,7 kg in einigen Tagen gegen einen stärkeren Hyperthyreoidismus.

Die 6 übrigen Fälle von Thyreotoxikose zeigen alle einen stark erhöhten Gipfelwert (höchster 175 mgr Prozent) nach Lävulosegabe, jedoch geht dieser Wert mit dem Grundumsatz nicht parallel, was nach Lublin¹⁰ zu erwarten ist, der in der Hälfte aller von ihm beobachteten nicht voll entwickelten Basedowkrankheiten eine Erhöhung des Grundumsatzes vermißte.

Von den sieben Kurven zeigen vier einen erhöhten Anfangswert. Der Schlußwert sinkt bei drei Fällen um ein Beträchtliches unter den Nüchternwert (bei F 6 und 7 um 20 mgr Prozent); die übrigen Kurven bleiben nach 3 Stunden auf dem Anfangswert stehen. Die Kurve 8 zeigt zwei Gipfelwerte von denen der zweite nach 2 Stunden den höchsten Wert erreicht.

Bei Hyperthyreoidismus erhielt Kugelman⁷ nur einmal einen Blutzucker über 100 mgr Prozent. Der höchste Gipfelwert nach Lävulose betrug 180 mgr Prozent. Nach drei Stunden stand bei allen Fällen der Blutzucker noch hoch über

den nüchternen. Hetényi⁴ fand beim Basedow nüchtern 113 mgr Prozent, 50 Minuten nach der Lävulosegabe 130 mgr Prozent.

Bei dem hier mitgeteilten Fall von Pankreatitis chronica geht der ursprünglich sehr niedrige Wert nach Belastung hoch hinauf. Dies entspricht den Beobachtungen Bernhards¹¹, der bei Pankreaserkrankungen eine Störung im K. H. Stoffwechsel fand.

Ueberblickt man die Kurven bei nervösen Störungen und den innersekretorischen Erkrankungen, so lassen sie fast nie einen pathologischen Verlauf vermissen, der bei nervösen Störungen durch Abfallen des Schlußwertes unter den Nüchternwert, bei den Thyreotoxikosen in einem erhöhten Nüchtern- und Gipfelwert und bei einigen in einem tiefen Absinken des Drei-Stundenwertes charakterisiert ist.

Gruppe IV.

Lebererkrankungen

Die Fälle mit klinisch nachweisbarer Leberschädigung (s. Tab. IV.) zeigen, bis auf einige Ca Metastasen in der Leber, eine pathologische Kurve. Auffallend ist, daß durchweg der Nüchternwert an der Grenze zum Pathologischen liegt oder leicht erhöht ist. Ähnlich ist es auch bei den Leberschädigungen in Tab. II. Auch die Nüchternwerte, die Hetényi bei Leberschädigungen fand, lagen an der Grenze zum Pathologischen oder waren leicht erhöht, was im Sinne eines Leberdiabetes spricht, so wie ihn Singer¹² nach Leber- und Gallengangserkrankungen fand oder wie er bei thyreotoxischen Leberschädigungen zu sehen ist. Einzelheiten zeigt Tab. IV.

Nach den Ergebnissen unserer Untersuchungen scheint es so, wie Heinicke und Peters feststellten, daß die akuten Lebererkrankungen einen hohen ansteigenden und steil abfallenden Kurvenverlauf haben; jedoch kehren die Drei-Stundenwerte nie zum Anfangswert zurück, sondern bleiben regelmäßig um 10 und mehr mgr Prozent zurück. Besonders hoch ist der Rückstand bei den schweren akuten Lebererkrankungen (s. Tab. IV. F. 7 und 13).

Von den chronischen Erkrankungen blieb die Kurve bei Hypertrophischer Lebercirrhose auf der Höhe stehen, die dann in der dritten Stunde bis auf 355 mgr Prozent an-

gestiegen war, um aber nach vier Stunden, trotzdem der Patient Milch und Semmel zu sich genommen hatte, auf 149 mgr Prozent abzufallen. F 23 Lebercirrhose wies eine ausgesprochene pathologische Kurve mit hohem Nüchtern- und sehr hohen Gipfelwert auf, kehrte aber nach drei Stunden zum Nüchternwert zurück. Bei den Carcinomfällen mit Ikterus geht die Größe der Differenz zwischen dem Nüchternwert und dem Dreistundenwert mit der Dauer des bestehenden Ikterus nicht parallel. Der F 16 mit Lebercarcinom zeigt die größte Differenz und ein ständiges Ansteigen während des ganzen Versuches. F 15 hat schon nach einer halben Stunde fast den Gipfelwert erreicht und bleibt auf diesem bis nach zwei Stunden stehen, um erst dann in der dritten Stunde abzufallen (s. Bild IV). Trotz bestehendem Ikterus weisen die anderen vier Fälle mit Ca Metastasen in der Leber normale Kurven auf. Bei F 22 Leber-Milz-Polyserositis T. B. C. erreichte die Kurve schon nach zwei Stunden wieder den Nüchternwert.

Die Wiederholungsfunktionsprüfung nach klinischer Heilung ergaben normale Kurven oder doch eine wesentliche Besserung (s. Bild III). Desgleichen auch die Kurven von F 4 und 5 die in dem Stadium der Abheilung aufgenommen wurden. F 2, der wegen eines Ulcus duodeni in Behandlung war, erkrankte in der Klinik an Ikterus katarrhalis. Die vor dem Ikterus aufgenommene Kurve zeigte einen vollkommen normalen Verlauf, während zur Zeit des Ikterus die Funktionsprüfung eine pathologisch ansteigende Kurve ergab. Nach Verschwinden des Ikterus kehrte die Kurve wieder zur vorhergehenden zurück. Heinicke und Peters fanden bei den Funktionsprüfungen an Leberkranken nach Ablauf der Krankheit ausnahmslos normale Kurven. Von den Fällen 11 und 12 Cholecystitis chronica zeigte F 11 keine pathologische Kurve, wohl stieg F 12 bis zur Grenze des Normalen oder Anfang des Pathologischen an. Ein Fall 10 von Cholecystitis subakuta zeigte eine pathologische Kurve mit erhöhtem Nüchtern- und Gipfelwert und starkes Absinken des Schlußwertes unter den Anfangswert.

Tabelle I.

Normalfälle.

Fall	Nüchtern	½	1	2	3 Stunden nach	Alter
					Lävulosegabe	Geschl.
1a	93	97	114	101	82	mgr %
b 2 Monate später	84	106	109	91	77	„ ♂
2	83	108	100	94	88	„ ♂
3	90	113	117	110	91	„ ♂
4	88	107	121	110	89	„ ♀
5a	108	127	167!	113	110	„ ♀
b 20 Tage später	96	125	109	117	108	„ ♀
6	100	108	101	83	98	„ ♂

Bild 1




Bild 1 zeigt als gestrichelte Kurve die niedrigste Normalkurve. Die andere Kurve stellt die höchst verlaufende Normalkurve dar, die gefunden wurde. (Nr. 5a ist hierbei weggelassen. Gründe dafür siehe oben.)

Tabelle II.

Krankheiten ohne klinisch nachweisbare Schädigungen

Fall	Nüchtern $\frac{1}{2}$		1	2	3	Stunden nach Lävulosegabe	Alter Geschl.
1 Magen- beschwerden	81	93	90	80	74	mgr %	♂ 21 J.
2 Chron. Gastritis	100	116	109	98	96	„	♂ 28 J.
3 Metoerismus	85	105	108	108	102	„	♂ 40 J.
4 Gastroenteros- pasmus	81	108	114	106	105	„	♂ 15 J.
5 Pylorusstenose	94	119	124	104	82	„	♂ 57 J.
6 Ulcus duodeni	81	109	125	111	95	„	♂ 46 J.
7 Ulcus duodeni u. allg. Nervosität	90	116	110	94	75	„	♂ 29 J.
8 Ulcus duodeni	90	112	108	99	94	„	♂ 20 J.
9 Para-Typhus B.	91	122	116	102	102	„	♂ 26 J.
10 Ischias	94	115	115	96	105	„	♂ 28 J.
11 Ischias	81	109	98	87	75	„	♂ 30 J.
12 Ischias (Diab. latens)	105	156	155	140	107	„	♂ 53 J.
13 Arthritis rheum. subchronica	79	104	102	97	89	„	♂ 58 J.
14 Arthritis	100	114	114	99	97	„	♂ 24 J.
15a Arthritis deform. (Diab. latens)	117	178	167	119	108	„	♂ 60 J.
15b	125	145	161	111	111	„	♂ 60 J.
16 Emphysem	84	114	97	82			♂ 32 J.
17 Emphysem	85	112	104	85	79	„	♂ 52 J.
18 Beschwerd. nach Lungenverletzg.	86	100	97	86	84	„	♂ 26 J.
19 Tumor cerebri	89	119	114	94	93	„	♂ 42 J.
20 Eosinophilie	82	96	92	87	81	„	♂ 46 J.
21 Angina	93	114	106	93	93	„	♂ 18 J.

Tabelle IIa.

Fall	Nüchtern	1/2	1	2	3	Stunden nach Lävulosegabe	Alter Geschl.
22 Vitium compens.	72	94	103	93	79	mgr %	♂ 48 J
23 Arteriosklerose mit Herzfehler	90	115	133	110	98	„	♂ 57 J.
24 Lues cerebri	115	137	131	129	110	„	♂ 52 J.
25 Lues cerebri	95	136	134	99	86	„	♂ 46 J.
26 Postencephalitis	100	140	130	104	93	„	♂ 24 J.
27 Ostitis fibrosa	105	125	111	106	141	„	♂ 37 J.
28a Perniz. Anämie	100	130	118	107	91	„ FJ 1,5	64 J.
28b	102	128	120	111	92	„ FJ 1,1	64 J.
29 Ascites TB. große Milz	100	121	135	115	92	„	
30 Nihil	100	108	101	83	98	„	
31 Nihil	78	115	88	77	77	„	
32 Retroperitoneal Sarkom	95	111	96	87			

Tabelle III.

Nervöse und innersekretorische Störungen

Fall	Nüchtern	'/2	1	2	3	Stunden nach Lävulosebelast.	Alter Geschl.
1 Allg. Nervosit.	99	120	118	100	86	mgr %	♂ 39 J.
2 Allg. Nervosit.	120	134	128	115	107	„	♂ 32 J.
3 Allg. Nervosit. (m. Ulc. duodeni)	90	116	110	94	75	„	♂ 29 J.
4a Ulcus duodeni	64	90	129	114	92	„	♂ 23 J.
4b Ulcus duodeni	104	114	107	104	101	„	♂ 23 J.
5 Hyperthyreoidis- mus (Grundum- satzsteig. 52,7%)	87	157	129	99	90	„	♀ 22 J.
6 Hyperthyreoidis- mus (Grundum- satzsteig. 25%)	131	175	162	135	105	„	♂ 17 J.
7 Hyperthyreoi- dismus	132	140	156	122	113	„	♂ 16 J.
8 Basedow (Grundumsatz- steiger. 112%)	107	135	125	150	119	„	
9 Basedow (Grundumsatz- steiger. 50%)	107	133	144	120	99	„	♀ 22 J.
10 Thyreotoxikose (Grundumsatz- steiger. 25%)	88	167	164	107	90	„	
11 Hyperthyreoidis- mus (Grundum- satzsteig. 25%)	88	119	124	93	95	„	♂ 28 J.
12 Thyreotoxikose (Grundumsatz- steiger. 5%)	80	101	131	82			
13 Adipositas	110	129	135	121	109	„	♂ 40 J.
14 Dystrophia adiposo genital.	90	141	116	95	83	„	♂ 35 J.
15 Pankreatitis chronica	64	142	84	88	70	„	

Tabelle IV.

Lebererkrankungen

Fall	Nüchtern	1/2	1	2	3	Stunden nach Lävulosegabe	Alter Geschl.
1a Ikt. catarrh	98	129	137	117	104	mgr %	♂ 40 J.
1b nachklin. Heilung	89	131	100	91	86	„	♂ 40 J.
2a Ikt. catarrh	89	128	137	101	99	„	♂ 22 J.
2b nachklin. Heilung	90	112	108	99	95	„	♂ 22 J.
2c vor dem Ikterus	86	109	102	98	88	„	♂ 22 J.
3a Ikt. catarrh	98	125	132	124	112	„	♀ 21 J.
3b nachklin. Heilung	92	104	100	94	90	„	♀ 21 J.
4 Ikt. catarrh im Stadium d. Besserung	85	103	108	106	101	„	
5 Ikt. catarrh. abgeklungen	92	118	118	122	88	„	
6 Ikt. bei Schwangerschaft	93	138	95	115	114	„	♀ 30 J.
7 Cholecystitis subakuta	114	115	127	146	121	„	♂ 40 J.
8 Cholecystitis subakuta	104	109	141	116	103	„	♀ 39 J.
9a Cholecystitis-angitis	101	144	185	155	142	„	♀ 60 J.
9b n. klin. Heilung	103	143	117	116	94	„	♂ 60 J.
10 Cholecystitis subakuta	131	143	117	117	102	„	
11 Cholecystitis chronica	86	114	120	103	86	„	♂ 28 J.
12 Cholecystitis chronica	86	120	126	92	88	„	
13 Salyrgan-Ikterus	109	125	170	155	142	„	♂
14 Ca. ventriculi mit allg. Metastasierung	111	141	148	129	120	„	♀ 49 J.
15 Choledochus-verschluß	100	142	146	145	120	„	♀
16 Lebercarcinom mit Metastasen	100	125	136	139	144	„	♂ 53 J.

Tabelle IVa.

Fall	Nüchtern	1/2	1	2	3	Stunden nach Lävulosegabe	Alter Geschl.
17 Ca Leber- metastasen	96	111	103	114	97	mgr ‰	
18 Ca Leber- metastasen	74	107	103	87	96	„	
19 Ca Leber- metastasen	93	125	121	97	72	„	
20 Ca der Gallenbl. mit Metastasen	83	98	106	83	81	„	
21 Hyperthioph. Lebercirrhose	77	144	149	140	355	„	Frühst. 149 mgr ‰ ♂ 46 J.
22 Leber-Milz- Polyserositis	110	145	154	111	114	„	♂ 28 J.
23 Leberzirrhose	163	204	282	216	156	„	

Bemerkungen zu Tabelle IV

F. 6. Ikterus bei Schwangerschaft: Es konnte eine genaue Diagnose nicht gestellt werden, da die Patientin gleich wieder die Klinik verließ.

F. 7. 60 Jahre mit fieberhafter Erkrankung, Leukocyten 16 000, hochgradiger Ikterus. Urobilin und Urobilinogen im Harn stark positiv.

F. 13. Hatte ambulant eine Reihe von Salyrganinjektionen bekommen, worauf leichte Gelbfärbung der Skleren auftrat.

F. 14. Seit etwa 14 Tagen ikterisch verfärbt. Bei der Aufnahme grünlich-gelbe Verfärbung der Haut. Ascites, im linken Oberbauch sehr harte zusammenhängende, höckrige, verschiebbliche Tumoren zu fühlen. Im Urin Bilirubin positiv, kein Urobilin und Urobilinogen. Stuhl von bräunlich-grauer Farbe, immer Blut chemisch nachweisbar. Röntgenfoto zeigt zerfressene Konturen des Magens. Es handelt sich um ein Ca. Ventriculi mit einer Peritoneal-Carcinose und wahrscheinlich Metastasen in der Leber.

F. 15. 70 Jahre. Seit drei Wochen Gelbsucht, Leber drei Querfinger unter dem Rippenbogenrand. Leberrand nicht ganz glatt. Stuhlgang weiß. Im Urin kein Urobilinogen. Bilirubin im Blut sehr stark positiv. Röntgenologisch Magen o. B. Normale Säurewerte. Wahrscheinlich handelt es sich um einen Gallengangs-Ca. mit Choledochusverschluß.

F. 16. 53 Jahre. Seit 5 Wochen täglich kolikartige Schmerzen von der Niere bis zur Blase herunterziehend. Seit 2 Wochen Ikterus und Erbrechen von kaffeesatzähnlichen Massen. Abdomen gespannt. Nieren- und Lebergegend stark druckempfindlich. Hepar 2 Querfinger unter dem Rippenbogen tastbar. Im Urin: Urobilin (*), Urobilinogen (*), Bilirubin *. Stuhl teerartig, Sanguis **, im Blut Bilirubin *. Röntgenaufnahmen können wegen schlechtem Zustand des Patienten nicht aufgenommen werden. Wahrscheinlich handelt es sich um ein Lebercarcinom mit Metastasen.

F. 21. 27 Jahre erkrankte vor 4 Wochen mit Schmerzen im Unterleib und Schwellung der Lebergegend. Temperatur 38—39°. Bei einer Operation wurde neben wenig Ascites eine große aber glatte Leber gefunden und eine um das vierfache vergrößerte Milz. Jetziger Befund starker Ascites, Punktion ergab 4,7 lt hämorrhagischer Flüssigkeit. Bakteriologisch steril, Leber und Milz stark vergrößert. Bilirubin im Blut direkte Probe negativ, indirekte Probe positiv.

Bild 1




Bild 2, Kurve Ia zeigt die Kurve F 9, Tab. IV. einer schweren akuten Cholangitis mit noch hohem Drei-Stundenwert. Die gestrichelte Kurve Ib stellt die Leberfunktionsprüfung nach klinischer Abheilung dar.

Kurve IIa ist die eines katarrhalischen Ikterus (F 3 Tab. IV). Sie steigt bei weitem nicht so hoch an, wie die der schweren Lebererkrankung und die Wiederholungskurve IIb nach klinischer Heilung zeigt eine vollkommen normale Kurve an.

Bild 3




Bild 3 zeigt den Verlauf zweier chronischer Lebererkrankungen (F 15 und 16 Tab. IV).

Fassen wir unsere Ergebnisse zusammen, dann kamen wir zu folgendem Resultat:

Bei normalen Menschen kommt es nach Lävulosegabe (100 gr) zu einem Anstieg des Blutzuckers, der nach einer halben bis einer Stunde den Höhepunkt erreicht. Ueber 130 mgr Prozent steigt der Blutzucker nicht an. Vom Ausgangswert aus gerechnet beträgt der Anstieg unter 30 mgr Prozent. Darüber hinaus sind die Kurven als krankhaft anzusehen. Die krankhaften Kurven sind entweder solche, die steil ansteigen und schnell wieder abfallen, oder solche, die langsamer ansteigen und nach 3 Stunden noch nicht den Ausgangswert erreicht haben. Zwischen diesen beiden Kurven gibt es Uebergänge. Ein besonders gutes Beispiel der ersten Type ist die Kurve bei Thyreotoxikosen. Die Kurven bei Lebererkrankungen ähneln meistens mehr dem zweiten Typ, doch lassen sich hier kaum einzelne Gruppen abtrennen. Einigermäßen typisch erscheint die Kurve beim Ikterus Catarrhalis. (Mäßig hoher Anstieg, verzögerter Abfall.) Differenzialdiagnostisch von Interesse sind dagegen betrachtet die Kurven bei Ca. (resp. Ca. Metastasen) der Leber. Die Kurven verlaufen fast oft immer normal, wenn nicht ein Verschuß vorliegt, der sek. zu Ikterus geführt hat. Normale Kurven bei klinischen Symptomen, die auf eine Lebererkrankung hinweisen, sind also immer verdächtig auf Carcinom. Die akuten oder subakuten Cholecystitiden zeigen meist schon einen hohen Nüchternwert und einen verlangsamten Abfall. Da man annehmen muß, daß die pathologische Lävulosekurve der Ausdruck einer Parenchymschädigung ist, ist zu schließen, daß die Parenchymschädigung bei diesen Zuständen doch oft stärker ist, als man nach dem übrigen klinischen Befund annehmen möchte. In diesem Zusammenhang ist von besonderem Interesse, daß die Höhe des Blutzuckers fast ganz unabhängig ist von der Stärke des Ikterus. Ganz besonders hohe Werte sahen wir bei Lebercirrhosen (bis 355 mgr Prozent). Im großen und ganzen stimmen also unsere Befunde mit denen von Heinicke u. Peters⁵ überein, nur haben wir den Eindruck, daß eine Trennung von Kurventypen bei einzelnen Erkrankungen nicht gut möglich ist, da die Uebergänge zwischen den einzelnen Typen doch recht fließend sind. Die Methode bedeutet zweifellos einen großen Fortschritt in der funktionellen Leberdiagnostik und wir möchten sie nicht mehr missen. Wir sind allerdings überzeugt, daß mit größerem Material wir in diesem oder jenem Punkte unsere Ansicht korrigieren müssen.

Zusammenfassung

1. Nach 100 gr Lävulose kommt es beim Normalen zu einem geringen, 1—2 Stunden dauernden Anstieg des Blutzuckers. Die Variation des Kurvenverlaufes beim Gesunden ist so gering, daß die „Normalkurve“ sich leidlich genau reproduzieren läßt.

2. Alle Leberschädigungen (Ikterus catarrhalis, Lebercirrhosen usw.) zeigen eine erhöhte Kurve, u. U. auch einen verlangsamten Abfall. Ähnlich reagieren die Thyreotoxikosen. Im allgemeinen ist die Kurve bei akuten Krankheiten stärker erhöht, als bei den gleichen Krankheiten mit chronischem Verlauf. Lebercarcinome resp. Metastasen zeigen eine erhöhte Kurve anscheinend nur bei sek. Ikterus, resp. ausgedehnter Lebermetastasierung.

Es ist mir eine angenehme Pflicht, an dieser Stelle Herrn Geh. Med.-Rat Prof. Dr. V o i t für die Stellung des Themas zu danken.

Herrn Privatdozent Dr. B ü t t n e r danke ich für die Unterstützung und Beratung bei der Arbeit.

Literatur

1. Strauss, Med. Woschr., 1901, Nr. 44/45.
2. van Crefeld und Laudenius Z., Klin. Med. 1928, 107.
3. Isaac, Klin. Woschr., 1910, 1167.
4. Hetényi, Deutsche Med. Woschr. 1921, Nr. 36.
5. Heinicke und Peters, Klin. Woschr. 1930, Nr. 33.
6. Scharpf, Z. f. Ges. Exper. Med. 1924. B. 43. S. 216.
7. Kugelmann, Klin. Woschr., 1930, Nr. 33.
8. Grafe, Verdauungs- und Stoffwechselkongreß, 1930.
9. Meulengradht und Paul Iversen, Klin. Med. 148.
10. Lublin, Z. Klin. Med., 1930, 114.
11. Bernhard, Klin. Woschr., 1930, Nr. 29.
12. Singer, Z. Klin. Med., 1930, 114.

Lebenslauf

Ich, Robert Neuhaus, geb. am 29. 9. 1906 in Hagen, als Sohn des Postinspektor Wilhelm Neuhaus, studierte nach bestandener Reifeprüfung im März 1926 am Albrecht Dürer Realgymnasium zu Hagen, Medizin im Sommersemester 1926 — Sommersemester 1927 an der Universität in Kiel, im Wintersemester 1927-28 an der Universität in Rostock. Nach der im März dortselbst abgelegten ärztlichen Vorprüfung studierte ich im Sommersemester 1929 in Köln, im Wintersemester 1928-29 in Gießen, im Sommersemester 1929 in Graz, im Wintersemester 1929-30 — Wintersemester 1930-31 in Gießen. Dortselbst beendigte ich die ärztliche Prüfung am 12. Juni 1931.

